

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 27-6-75058711

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative - 67084 STRASBOURG CEDEX

Tél. 34-14-63 - Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 50 F
XXXX
XXXX

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, Rue des Mineurs

67070 STRASBOURG-CEDEX

Bulletin n° 55

20 juin 1975

VIGNE

MILDIOU

Après une longue période sèche, les pluies que nous avons connues à partir du 15 juin ont été profitables à la vigne, sans pour autant avoir de conséquences graves quant à l'évolution du Mildiou.

Par contre, celles du 19 juin, particulièrement violentes et abondantes, qui se sont abattues sur la plus grande partie du vignoble, ont lessivé la vigne, réduisant ainsi fortement l'efficacité de la première protection fongicide. D'autre part, les fortes précipitations qui furent le plus souvent accompagnées de brouillards ont créé des conditions très favorables aux contaminations.

Un deuxième traitement devra être effectué dans les délais les plus brefs, dès qu'il sera possible de pénétrer dans les parcelles. Cette nouvelle intervention est d'autant plus urgente que les premières taches ont été observées le 18 juin dans le sud du vignoble.

OIDIUM

Avoir soin d'ajouter un produit spécifique contre l'Oïdium à la bouillie anti-Mildiou. La maladie est maintenant présente dans quelques situations. Elle risque de se développer dangereusement si la protection des vignes n'est pas assurée correctement.

CULTURES MARAÎCHÈRES

- POIREAU -

TEIGNE DU POIREAU

Comme les années précédentes, les contrôles des vols de la Teigne du poireau sont suivis par pièges sexuels en liaison avec la Station Expérimentale d'Alsace à WINTZENHEIM. Les premières captures notées le 12 juin, se sont intensifiées le 16 juin.

Un traitement insecticide est donc à prévoir dans la période du 26 au 28 juin. Pour le choix des produits, consulter notre bulletin n° 50 du 13 mai 1975.

- POIS -

TORDEUSE DU POIS

Ce sont les variétés tardives qui sont le plus fortement attaquées. Sur ces variétés, appliquer un traitement à la fin de la floraison avec diéthion à 1 kg de m. a./ha ou de phosalone à 0,600 kg de m. a./ha.

Les Ingénieurs chargés des
Avertissements Agricoles :

C. GACHON

J. GENNATAS

C. JANUS

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la
Circonscription Phytosanitaire
"ALSACE et LORRAINE"

J. HARRANGER

417